

レジメン名 CAPIRI療法

対象患者	大腸がん
1サイクルの期間	21日
催吐性リスク	中等度

投与順	注射薬	投与量	投与時間	投与日
①	パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	0.75mg 9.9mg 100mL	30分	Day1
②	イリノテカン 生理食塩液	200mg/m ² 250mL	90分	

内服薬	1日量	用法	内服日
炭酸水素ナトリウム	1.8g	毎食間	Day1～4
デキサメタゾン	8mg/日	朝・昼食後	Day2、3
カペシタビン	1600mg/m ²	朝・夕食後	Day2～15※ ¹

【カペシタビン投与量】

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.26m ² 未満	900mg	1800mg
1.26m ² 以上1.31m ² 未満	1200mg	2400mg
1.31m ² 以上1.69m ² 未満	1500mg	3000mg
1.69m ² 以上1.76m ² 未満	1800mg	3600mg
1.76m ² 以上1.88m ² 未満	1800mg	3600mg
1.88m ² 以上2.07m ² 未満		
2.07m ² 以上2.26m ² 未満		
2.26m ² 以上		

※¹ Day1夕食後から開始の場合はDay15朝食後まで服用