

## レジメン名 ベバシズマブ+UFT/LV療法

対象患者	大腸がん
1サイクルの期間	28日
催吐性リスク	軽度

投与順	注射薬	投与量	投与時間	投与日
①	ベバシズマブ 生理食塩液	5mg/kg 100mL	90分(初回) 60分(2回目) 30分(継続)	Day1,15

内服薬	1日量	用法	内服日
UFT	300mg/m <sup>2</sup>	1日3回 <sup>※1</sup>	Day2~22 <sup>※2</sup>
LV	75mg	1日3回 <sup>※1</sup>	Day2~22 <sup>※2</sup>

## 【UFT投与量】

体表面積	1日用量	1日の投与スケジュール		
		午前	午後	夜間
1.17m <sup>2</sup> 未満	300mg	100mg	100mg	100mg
1.17m <sup>2</sup> 以上1.49m <sup>2</sup>	400mg	200mg	100mg	100mg
1.50m <sup>2</sup> 以上1.83m <sup>2</sup>	500mg	200mg	200mg	100mg
1.83m <sup>2</sup> 超	600mg	200mg	200mg	200mg

※<sup>1</sup> 約8時間毎、食事の前後1時間を避ける

※<sup>2</sup> Day1夕食後から開始の場合はDay22朝食後まで服用